# BULLETIN

DE LA

# SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

---

## Séance du 26 octobre 1904.

Présidence de M. P. MABILLE.

M. L.-G. Le Comte (du Vigan) assiste à la séance.

*Nécrologie.* — Le Président annonce avec regret la mort de M. le Dr F. du Roselle, notre collègue depuis 1894, et celle de M. H. Tournier, entré au sein de notre Société en 1858.

*Correspondance.* — M. G.-W. Kirkaldy remercie la Société de son admission.

— Le Président donne lecture de la lettre suivante :

Metz, 10 octobre 1904.

Monsieur le Président et cher Collègue,

Je me permets de vous offrir pour la Société ma dernière photographie, celle d'un vieil infirme gisant sur son lit depuis 1883 sans interruption. Joli bail !

Je suis, je crois, un des plus anciens membres, ayant été admis en 1851. Mon état vous explique pourquoi je ne travaille plus guère ; au lit, il est presque impossible de manier les insectes, et très pénible d'écrire.

Je n'en tiens pas moins à donner un bon souvenir très confraternel à mes bons collègues, et vous prie, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus dévoués.

A. DE SAULCY.

*Changements d'adresse.* — M. L. Bleuse, rue de la Bletterie, Rennes (Ille-et-Vilaine).

— M. J. Sainte-Claire-Deville, capitaine d'artillerie, 74, route de Couches, Le Creusot (Saône-et-Loire).

— M. L. Gratiolet, 4, rue Linné, Paris, 5e.

— M. G.-W. Kirkaldy, Hawaiian Sugar Planter's Assoⁿ, Div. of Entomology, Honolulu (îles Havaï).

— M. Ed. Lamy, 47, rue Claude-Bernard, Paris, 5e.

— M. P. de Peyerimhoff, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustapha (Alger).

— M. A. Raffray, 37, rue Davioud, Paris, 16e.

*Présentations.* — M. Jean-François-Victor Auzat, Dr en Médecine, présenté par M. J. Clermont. — Commissaires-rapporteurs : MM. Maurice Royer et P. Dumont.

— M. Aimé Derancourt, professeur au collège Rollin, présenté par M. J. Clermont. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. Magnin et R. Jeannel.

*Don de la correspondance scientifique de P.-A. Latreille.* — Le Secrétaire fait part de l'arrivée au siège de notre Société de l'envoi de M. Valade-Gabel contenant la correspondance scientifique et des notes inédites de P.-A. Latreille.

*Don aux collections.* — M. G. Mingaud fait généreusement don à la Société de quatre exemplaires capturés par lui d'*Aphodius cuniculorum* Mayet, espèce décrite dans le *Bull. Soc. ent. Fr.* [1904], p. 130.

*Avertissement.* — Le Trésorier prie instamment les membres de la Société qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1904 de vouloir bien lui faire parvenir sans retard cette cotisation s'ils veulent recevoir régulièrement, dès leur apparition, les fascicules des *Annales* de 1904, qui seront prochainement mis en distribution.

---

## Communications

### Descriptions de deux *Bathyscia* inédites des Basses-Pyrénées [Col.]

par E. Abeille de Perrin.

**Bathyscia Jeanneli**, n. sp. — Taille et couleur de *Pyrenaea* Lesp. Pubescence rousse, assez abondante. Antennes extrêmement longues, atteignant les quatre cinquièmes des étuis, très minces, à derniers articles subégaux, non plus renflés, même chez les mâles, le 8e à peine plus court et plus mince que ses voisins. Corselet subconvexe, régulièrement arqué à la base. Élytres légèrement plus larges

que lui à leur racine, très longs, très acuminés au sommet, presque cunéiformes, convexes, à suture déprimée et flanquée d'une strie très nette jusqu'aux deux tiers, à strioles transversales très fines et très serrées. Crête du mésosternum droite, tranchante, terminée par un angle obtus. — ♂. Tarses antérieurs très dilatés. Tibias postérieurs arqués dans leur seconde moitié; leurs tarses un peu épaissis à leur base; éperons de ces mêmes tibias très minces et très longs.

Basses-Pyrénées. Découvert par M. René Jeannel.

La description plus détaillée de cette espèce paraîtra dans un travail d'ensemble que je prépare sur les *Bathyscia* des Pyrénées.

**B. Elgueae**, n. sp. — Brun testacé, ovale peu allongé, peu convexe, peu atténué au sommet. Pubescence dorée, très fine. Strie suturale nette et bien dessinée jusqu'aux deux tiers de l'élytre, la suture elle-même non déprimée. Corselet semi-lunaire, à base presque droite et à angles postérieurs prolongés en arrière. Élytres très finement striolés en travers. Antennes allongées; les deux derniers articles plus courts, ainsi que le 8e; les 7e et 9e plus longs et plus renflés au sommet, surtout chez les mâles. Tarses antérieurs peu renflés et ne formant nullement patelle. Crête du mésosternum tranchante et régulièrement arquée.

Découvert par notre collègue M. Trapet dans une petite grotte des Basses-Pyrénées et dédié à Mme Trapet, née Elgue. Je dois le don de cette gracieuse espèce à mon ami Bedel.

Même observation que pour l'espèce précédente.

---

## Description de deux espèces nouvelles de Coléoptères de l'Arabie

par le Dr A. Chobaut.

**Thorictus Peyerimhoffi**, n. sp. — Brun marron foncé, brillant, le pronotum finement ponctué et glabre, les élytres avec de petits points d'où part une fine soie couchée, courte, à peine visible. Pronotum sans villosité jaune d'or aux angles postérieurs; à peine plus distinctement ponctué sur la partie postérieure des côtés que sur le disque; finement rebordé à la base, cette bordure aussi serrée contre la base sur les côtés qu'au milieu; arrondi sur les côtés; base avec, de chaque côté, une impression profonde d'où part un large sillon qui va mourir graduellement le long des côtés, séparant ainsi le disque des bords la-

## Sur la biologie du *Chrysomphalus dictyospermi* var. *minor* Berlese, et sur l'extension de cette Cochenille dans le bassin méditerranéen [Hémipt.]

par le Dr P. Marchal.

L'aire de répartition de cette Cochenille, dont j'ai signalé, en 1899, dans le *Bulletin de la Société entomologique de France,* l'apparition dans le Midi de la France, va en s'élargissant de plus en plus. D'abord localisée à Cannes et au golfe Juan, elle n'a pas tardé à envahir la région de Nice, et, cette année, M. Rousset, professeur à l'École d'Horticulture d'Hyères, m'adressait des échantillons de feuilles d'Oranger et de plantes d'ornement diverses infestées par cet Insecte. La France n'est pas le seul pays dont les cultures subissent l'invasion de ce nouvel ennemi, et l'Espagne commence à être également atteinte. En 1902, un correspondant de Séville m'envoya des feuilles d'Oranger couvertes de *Chrysomphalus minor,* et me communiquait en même temps que, depuis un an, il s'était aperçu de la présence de cette Cochenille dans la propriété qu'il possédait à Séville et qui était plantée d'Orangers sur une superficie de plus de 5 hectares. Le mal était, d'après lui, très inquiétant par sa rapide progression; les insectes étaient si nombreux qu'ils occasionnaient la chute des feuilles, et, à mesure que de nouvelles repoussaient, elles étaient de nouveau infestées.

D'où nous vient donc ce *Chrysomphalus minor* surgissant ainsi tout à coup dans le bassin méditerranéen comme un ennemi des plus envahissants? Son abondance aux Antilles semble indiquer la région néotropicale comme étant son pays d'origine; il est, en tout cas, très répandu dans ce pays, où il a été signalé par Cockerell, d'abord sous le nom d'*Aspidiotus* (*Chrysomphalus*) *dictyospermi* var. *jamaicensis* Ckll., puis sous celui de *Chrysomphalus dictyospermi* var. *pinnulifera* Mask. D'après Maxwell-Lefroy, entomologiste d'État des Indes Occidentales, c'est, aux Petites Antilles, l'une des Cochenilles les plus nuisibles aux Rosiers et aux Palmiers. *Chr. dictyospermi* est, d'autre part, répandu dans l'Asie tropicale, et Cockerell estime qu'il est probablement originaire de cette région.

Quoi qu'il en soit à cet égard, l'espèce dont nous nous occupons peut être considérée comme une Cochenille originaire des pays tropicaux, dont l'importation dans le bassin méditerranéen est récente, et qui a été évidemment introduite avec les plantes d'ornement exotiques à feuilles persistantes.

D'abord cantonnée dans les serres, elle s'est ensuite multipliée à l'air libre et a trouvé dans notre climat méditerranéen des conditions très favorables pour son développement.

Chose curieuse, elle devient, dans sa nouvelle patrie, plus envahissante et plus destructive que dans son pays d'origine; son adaptation à l'Oranger ne s'est certainement faite nulle part avec une intensité aussi grande que sur notre littoral méridional. Aux Antilles, où l'insecte est si commun, il n'est même pas mentionné comme nuisible aux Orangers.

La facilité avec laquelle le *Chr. minor* s'adapte, dans le bassin méditerranéen, à des plantes très diverses, favorise singulièrement les progrès de l'invasion à laquelle nous assistons.

Outre les Orangers et les Citronniers, on peut compter, parmi les plantes les plus infestées, le Fusain du Japon (*Evonymus japonica*), le Myrte (*Myrtus communis*), le Lierre (*Hedera helix*), le Buis (*Buxus sempervirens*), les Magnolias, les Palmiers d'espèces diverses.

Les principaux faits que j'ai pu constater au sujet de la biologie du *Chr. minor* sont les suivants :

Cette Cochenille est ovipare, mais les œufs, au moment où ils sont pondus, contiennent déjà les larves toutes formées; aussi laissent-ils éclore ces dernières très peu de temps après la ponte. La sortie des larves ne se fait pas simultanément pour la progéniture d'un même individu, mais s'effectue d'une façon furfuracée. L'insecte continue sa ponte pendant au moins un mois, donnant ainsi quotidiennement naissance à des larves qui sortent de dessous le bouclier maternel au fur et à mesure de leur éclosion et vont se fixer le plus souvent dans le voisinage. La fixation a lieu d'une façon très rapide : une heure à peine après sa sortie, la larve s'est déjà fixée sur les feuilles, et, deux heures environ après la fixation, commence, sous forme d'un léger réseau blanc qui s'épaissit graduellement, la sécrétion du bouclier dont la présence constituera un obstacle insurmontable à la pénétration de la plupart des insecticides.

J'ai fait à Paris un élevage sur *Evonymus japonica* en contaminant, le 15 juin, un de ces arbustes avec des *Chr. minor* qui se trouvaient alors à la fin de la période d'émission des larves, et qui étaient fixés sur des rameaux d'Oranger envoyés d'Hyères au laboratoire par M. Rousset. J'ai pu ainsi, à l'abri de toute cause d'erreur résultant du chevauchement des générations l'une sur l'autre, me rendre compte qu'il existait, sous le climat de Paris, deux générations annuelles. Les larves qui s'étaient fixées en juin sur *Evonymus japo-*

*nica* étaient devenues des insectes adultes et gonflés d'œufs à la fin d'août, et, dès les derniers jours du mois, ils donnaient naissance à une nouvelle génération de larves qui se fixaient sur les feuilles. Elles sont actuellement transformées en insectes pourvus de boucliers, n'ayant pas encore atteint leur taille définitive, et qui ne deviendront vraisemblablement adultes qu'après la période hivernale. Il est probable que, dans le Midi, le nombre des générations est supérieur à deux.

Les données biologiques qui précèdent mettent en évidence la nature des difficultés que l'on doit rencontrer dans la lutte contre le *Chr. minor*. Elles résident dans les circonstances suivantes :

1° La facilité avec laquelle l'insecte s'adapte à des végétaux divers;

2° L'existence de plusieurs (au moins deux) générations annuelles;

3° La sortie des larves issues d'un même insecte ne s'effectuant pas d'une façon simultanée, mais au contraire pendant une longue période qui se prolonge durant un mois environ;

4° L'inégalité d'âge, au même moment, des individus d'une même lignée, fait qui résulte du précédent et qui vient prolonger dans une large mesure la période d'émission des larves pour une même génération;

5° Le temps très faible pendant lequel les larves ne sont pas protégées par un bouclier contre l'action des insecticides.

Les circonstances qui viennent d'être énumérées expliquent que les essais de destruction qui ont été tentés dans le Midi n'ont encore donné que des résultats fort incomplets. En attendant de nouvelles expériences, je crois utile de donner dès maintenant et à titre provisoire les indications générales suivantes :

Les traitements consistant en pulvérisations seront faits pendant la période d'activité de la végétation et devront être répétés à plusieurs reprises de mai à septembre.

Les insecticides qui jusqu'ici ont donné les meilleurs résultats pour des Cochenilles du même genre et vivant dans des conditions semblables, sont :

1° Les émulsions savonneuses de pétrole suivant les formules connues;

2° Les émulsions d'huile lourde de goudron de houille obtenues de préférence avec un savon résineux; elles ont été depuis longtemps préconisées contre les Cochenilles des Orangers sous le nom de *Pitteleina* par Berlese en Italie, et le Dr Trabut les a employées aussi avec succès en Algérie contre les diverses Cochenilles des mêmes arbres;

3° Les mélanges à base de colophane et de savon; ils sont très em-

ployés aux Antilles et recommandés par Maxwell-Lefroy précisément contre l'espèce qui fait l'objet du présent travail.

La pénétration de l'air et de la lumière devra être partout largement assurée.

Les plantes d'ornement à feuillage persistant devront, autant que possible, être tenues écartées des cultures d'Orangers.

---

## Bulletin bibliographique.

André (Ern.) : Description des Fourmis d'Europe pour servir à l'étude des Insectes myrmécophiles; (*Rev. Mag. Zool.*) 1874, 84 p., 1 pl. n. — Don de M. Ch. Janet.

Bruch (C.) : Metamórfosis y biologia de Coleópteros Argentinos, I; (*Rev. Mus. Plata*) 1904, 13 p., 3 pl. n. *

Cadíz (Dr. M.) : Enfermedades carbunclosas de los Animales; (*Ist. agr. Chile*) 1904, 70 p., fig. ⊙ *

Cecconi (G.) : Danni alla vite prodotti dal *Vesperus luridus* Rossi; (*Vitic. mod.*) 1900, 18 p., fig. — Don de M. Ch. Janet.

Id. : Zoocecidi della Sardegna, raccolti dal Prof. F. Cavara, I-III; (*Bull. Soc. bot. ital. — Marcell.*) 1901-3, fig. — Don de M. Ch. Janet.

Id. : Contribuzioni alla Cecidiologia italica, I, II; (*St. Sp. agr. ital.*) 1901-2. — Don de M. Ch. Janet.

Id. : Note di Entomologia forestale; (*Bull. Soc. ent. ital.*) 1902, 8 p. — Don de M. Ch. Janet.

Id. : Intorno ad alcune galle raccolte all' isola di Cipro; (*Malpighia*) 1901, 4 p. — Don de M. Ch. Janet.

Id. : Contribuzioni alla conoscenza delle Galle della foresta di Vallombrosa, IV, V, VI; (*Malpighia*) 1901, 1 pl. — Don de M. Ch. Janet.

Emery (C.) : Catalogo delle Formiche esistenti nelle collezioni del Museo civico di Genova, 1; III av. suppl.; (*Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*) 1877-1888, pl. et fig. — Don de M. Ch. Janet.

Felt (E.-P.) : Importance of Laboratory and Field Work in economic Entomology, and Record devices; (*Proc. 16th ann. conv. Ass. An. Agr. Coll. etc.*) s. d., 4 p. *

Felt (E.-P.) et D. B. Young : Importance of isolated rearings from Culicid larvae; (*Science*) 1904, 3 p. *

FIELDE (A.-M.) : Further Study of an Ant; (*Proc. Ac. Nat. Sc. Phil.*) 1901, 24 p., fig. — Don de M. Ch. Janet.

ID. : Portable ant Nests; (*Mar. Biol. Labor.*) 1900, 5 p., fig. — Don de M. Ch. Janet.

---

*Akad. umiejetnosci w Krakowie* (*Rozprawy*), XLIII, A et B, 1903. — ⊙

*Annals and Mag. of nat. Hist.* (*The*), sér. VII, vol. 14, n° 83. — W.-L. DISTANT : Rhynchotal Notes; XXVII. — C.-O. WATERHOUSE : Observations on Coleoptera of the Family Buprestidae, with Descriptions of new Species. — G. RICARDO : Notes on the smaller Tabanidae in the British Museum Collection. — E.-E. GREEN : On some Coccidae in the Collection of the British Museum, (fig.).

*Berliner entomologische Zeitschrift*, 1904, 1-2. — F. v. HOYNINGEN-HUENE : Beiträge zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna von Krasnoufimsk. — F. THURAU : *Busseola sorghicida*, eine neue Ost-Afrikanische Noctuide. — J. MOSER : Neue africanische Cetoniden-Arten. — O. SCHULTZ : Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren der palaearctischen Fauna, IV. — H.-J. KOLBE : Die morphologischen Verhältnisse der Artengruppen der africanischen Coleopterengattung *Tefflus*. — Dr O. THIEME : Neue Tagschmetterlinge aus der Südamerikanischen Cordillere, (pl.). — Zwei neue weisse Arten Lymanopoda. — Zwei unbeschriebene Euploeen der Insel Nias. — H. FRUHSTORFER : Beitrag zur Kenntniss der Rhopaloceren-Fauna der Insel Engano.

*Biologia Centrali Americana.* — Coleoptera, IV, 4 : Rhynchophora par G.-C. CHAMPION : pp. 337-376, pl. 18, 19. — Don de M. A. GROUVELLE. — Rhynchota Homoptera, II, par W. FOWLER, pp. 77-84, pl. 9, 1904. — Acquis pour la Bibliothèque.

*Canadian Entomologist* (*The*), XXXVI, 8-10, 1904. — R.-C. OSBURN : The Diptera of British Columbia, II, (2 art.) : The Syrphidae. — H.-L. VIERECK et DIVERS : Synopsis of Bees of Oregon, Washington, British Columbia and Vancouver. — III. — C.-S. LUDLOW : Mosquito Notes, 1 et 2. — W. BARNES : New Species of North American Lepidoptera, (2 art.). — T.-M. WEBSTER : The So-called human Flea, *Pulex irritans*, infesting the Opossum, *Didelphis virginiana*. — G.-W. TAYLOR : The Geometridae in the « Moth Book ». — J.-M. ALDRICH : The Genus *Psilopus* of authors. — E.-M. WALKER : The Crickets of Ontario. — G.-W. TAYLOR : A new Genus and Species belonging to the Geometridae. — T.-D.-A. COCKERELL : Some Notes on Aphididae. — F. HEATH : List of additional Mani-

toba Lepidoptera. — C. Robertson : Synopsis of *Prosopis* and *Colletes*, with supplementary Notes and Descriptions. — W.-H. Ashmead : A new Genus and some new Species of Hymenoptera from the Philippine Islands. — R.-V. Chamberlin : Three new Lycosids. — F.-H. Wolley : Strange attemptend Hybridization in nature. — E.-A. Back : New species of North American Asilidae. — J.-G. Needham : Beetle drift on Lake Michigan. — T.-D.-A. Cockerell : Notes on some Bees in the British Museum. — T.-H. Scheffer : A new genus of Spiders, (fig.). — W.-D. Kearfott : A new *Proteopteryx*.

*Department of Interior* (*Biological Laboratory*), 1904. — ⊙

*Deutsche Entomologische Zeitschrift,* 1904, II. — H. Gebien : Revision der *Pycnocerini* Lac. (Coleoptera-Heteromera). — J. Weise : Synonymische Bemerkungen zu Gorham, Biologia Centrali-Americana, vol. VII. — J. Gerhardt : Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1903. — Eine neue deutsche Käfer-Art, (fig.). — F. Hartmann : Neue Rüsselkäfer aus Ostafrika. — E. Hintz : Zur Kenntniss der *Trichodes Kraatzi* Reitter. — Dr W. Horn : 4 neue Cicindeliden gesammelt von den Herren O. Neumann und Baron v. Erlanger auf ihrer Expedition vom Roten Meer zum Nil. — W. Horn : *Cicindela innocentior,* n. sp. — Zur Kenntniss der Cicindeliden Fauna von Kamerun und seiner Hinterländer. — *Ophryodera rufomarginata* var. *circumcinctoides,* n. var. — *Megacephala Ertli,* n. sp. — J. Weise : Einige neue Cassidinen und Hispinen. — G. Vorbringer : Sammelbericht aus Ostpreussen. — — J. Schilsky : Synonymische Bemerkungen zur Gattung *Bruchus* L. (*Mylabris* Geoffr.). — J. Weise : Synonymische Bemerkungen über Hispinen.

*Deutsche Entomologische Zeitschrift « Iris »,* 1904, I. — Dr A. Petry : Zwei neue Gelechiiden aus den Central-Pyrenäen. — A. Winterstein : Aberrationen von *Arctia villica,* (1 pl. n.). — M. Bartel : *Eriogaster Phillippsi,* n. sp. — E. Suffert : Neue afrikanische Tagfalter aus dem K. zool. Museum, Berlin und meiner Sammlung, (3 pl. n.). — Neue Nymphaliden aus Africa. — Neue Tagfalter aus Deutsch-Ost-Africa. — H. Fruhstorfer : Neue indo-australische Lepidopteren. — Drei neue palaearktische Noctuiden. — M. Bartel : Ueber eine neue Form von *Erebia flavofasciata* Heyne.

*Entomological Society of Washington* (*Proceedings*), VI, 3, 1904. — F.-H. Chittenden : On the Species of *Sphenophorus* hitherto considered as *simplex* Leconte. — On the species of *Sphenophorus*

hitherto considered as *placidus* Say. — D.-W. Coquillett : New Diptera from India and Australia. — N. Banks : Two new Species of Caddis Flies. — H.-G. Dyar : Two new Forms of *Oeneis* Huebn. — H.-G. Dyar and F. Knab : Diverse Mosquito Larvae that produce similar Adults. — N. Banks : Notes on the structure of the thorax and maxillae in Insects, (1 pl.). — H.-G. Dyar : Notes on Synonymy and Larvae of Pyralidae. — O. Heidemann : Notes on North American Aradidae, with Descriptions of two now Species. — D.-W. Coquillett : New North American Diptera.

*Entomologische Berichten*, n^os^ 13 à 18, 1903-1904. — Nombreuses et courtes notes entomologiques.

*Entomologische Litteraturblätter*, 1904, 7, 8 et 10.

*Entomologiske Meddelser*, 1904, 5-6. — J.-P. Johansen : Om undersøgelse af Myretuer samt Fortegnelse over de i Danmark fundne, saakaldte myrmecophile Biller. — E. Fleck : Meine Reisen durch die Dobrudscha 1899 u. 1903 — H. Fruhstorfer : Mitteilungen über *Attacus Atlas* L. und Verwandte. — Neue Rhopaloceren aus dem Malayischen Archipel, (fig.). — J.-C. Nielsen : Tillaeg til min Meddelse : « Om *Perisemus fulvicornis* Curt. » — E. Wielandt : En Samling Coleoptera fra Fort Trekroner.

*Entomologist's monthly Magazine* (*The*), 1904, 483 à 486. — F.-D. Morice : Help-Notes towards the Determination of British Tenthredinidae, etc., (2 art.). — J.-R. Le B. Tomlin : Some Notes on Manx Coleoptera. — J. Arkle : Description of a new Variety of *Aplecta nebulosa* Hubn. from Delamere Forest, Cheschire. — J.-J. Walker : Some Notes on the Lepidoptera of the « Curtis » Collection of British Insects. — G.-H. Verrall : List of British Dolichopodidae, with Tables and Notes, (3 art.). — E. Saunders : Aculeate Hymenoptera collected in Tenerife by the Rev. A. E. Eaton in the Spring of 1904, with Descriptions of new Species, (2 art.). — E. Green : On some Javanese Coccidae ; with Descriptions of new Species, (fig.). L^d^ Walsingham : Algerian Microlepidoptera, (2 art.). — G.-H. Verrall : *Callicera Yerburyi*, n. sp. : a British Syrphid new to Science. — E. Saunders : Hymenoptera aculeata captured by Col. Yerbury in Scotland, 1904. — *Halictus fulvicornis* Kirb. distinct from *H. Freygessneri* = *subfasciatus* Nyl. — E.-A. Newbery : *Ocyusa nigrata* Fairm., a Species of Coleoptera new to Britain, with Remark on the other British Species of *Ocyusa*. — Notes diverses.

M. M.

---

*Le Secrétaire-gérant :* P. Chabanaud.